

Фіпро-Люкс
для собак та котів краплі протипаразитарні
(роздчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

фіпроніл – 100 мг;

пірипроксифен – 20 мг.

Допоміжні речовини: ПЕГ-400, ізопропіловий спирт, кислота лимонна, N-метил-піролідон.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53A, ектопаразитарні препарати для місцевого застосування (ATC vet QP53AX65, фіпроніл, комбінації).

Фіпро-Люкс для собак та котів краплі протипаразитарні, відноситься до комбінованих інсекто-акарицидних препаратів. Володіє інсекто-акарицидною активністю щодо преімагінальних і імагінальних фаз розвитку бліх, вошей, волосоїдів, іксодових і саркоптоїдних кліщів, що паразитують на собаках та котах.

Фіпроніл – інсекто-акарицид групи фенілпіразолів, механізм дії якого полягає в блокуванні ГАМК-залежніх рецепторів членистоногих, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до паралічу і загибелі ектопаразитів.

Пірипроксифен – інсектицид кишкової і контактної дії з групи аналогів природного ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток членистоногих. Механізм його дії полягає в порушенні процесів синтезу хітину, викликаючи загибель членистоногих на преімагінальних та імагінальних фазах розвитку, припиняє розвиток популяції на стадії яйця і личинки та появі імаго членистоногих на тваринах і в місцях їх утримання.

Фіпроніл і пірипроксифен надають тривалу контактну інсекто-акарицидну і репелентну дію, вони переносяться на шкірно-волосяний покрив тварини, накопичуючись в епідермісі, волосяних цибулинах і сальних залозах шкіри.

Препарат за ступенем впливу на організм теплокровних тварин відноситься до малонебезпечніших речовин і в рекомендованих дозах не має резорбтивно-токсичної, шкірно-подразнюючої і сенсибілізуючої дії.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis/felis*), іксодовими кліщами (*Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*, *Dermacentor spp.*), саркоптоїдними кліщами (*Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*), вошами (*Linognathus setosus*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), які паразитують на тваринах, особливо в теплу пору року (в період підвищеної активності паразитів), а також для захисту тварин від нападу комарів.

Дозування

Препарат застосовують лише зовнішньо. У ділянці шії біля основи черепа розділити шерсть тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь зміст безпосередньо на суху неушкоджену шкіру у місця недоступні для злизування (ділянка холки та вздовж хребта). Дози препарату становлять:

Маса тіла тварини, кг	Об'єм піпетки-крапельниці, мл	Кількість піпеток-крапельниць, необхідних для обробки
Собаки		
Від 1,5 до 4	0,5	1
Від 4 до 10	1,0	1
Від 10 до 25	2,0	1
Від 25 до 40	4,0	1
Від 40 до 60	6,0	Комбінація піпеток
Коти		
Від 1,5 до 4	0,5	1
Від 4 до 8	1,0	1

Обробку тварин масою понад 60 кг проводять, використовуючи комбінацію піпеток різного фасування.

При обробці великих собак лікарський засіб наносять на шкіру в 3-4 місця.

Для знищення бліх, вошей і волосоїдів, а також профілактики нападу іксодових кліщів препарат, розставивши шерсть, крапельно наносять безпосередньо на шкіру в місця, недоступні для злизування - між лопатками біля основи шій.

Тривалість захисної дії лікарського засобу після одноразової обробки тварини зберігається проти іксодових кліщів у собак до 30 діб, у котів - до 21 доби, проти комах у собак - до 2 місяців, у котів - до 1,5 місяців.

Повторні обробки тварин препаратором протягом сезону активності паразитів рекомендується проводити за показаннями, але не частіше 1 разу на місяць.

З метою запобігання повторної інвазії блохами, тваринам замінюють піdstилки або обробляють їх дозволеним до використання інсектицидним засобом відповідно до інструкції по застосуванню.

Акарицидна дія лікарського препарату проявляється через 12-24 години, з огляду на це, обробки слід проводити не пізніше, ніж за 24 години до передбачуваного вигулу тварини в місцях можливого перебування кліщів (парки, сквери, ліс).

Для знищення іксодових кліщів на тілі тварини лікарський препарат в кількості 1 краплі наносять на кліща і місце його прикріplення до шкіри. Якщо протягом 20 хвилин кліщ мимоволі не відпадає, його акуратно витягають зі шкіри пінцетом і знищують.

Для лікування отодектозу зовнішній слуховий прохід очищають від струпів і корок, потім закапують в кожне вухо по 3-5 крапель препарату (краплі обов'язково вводять в обидва вуха), вушну раковину складають вздовж, навпіл і масажують. Залишок препарату з використаної піпетки (в розрахунку на масу тварини) наносять на шкіру між лопаток. Обробку проводять 2-3 рази з інтервалом 7-10 діб. При ускладненні отитом, призначають протимікробні і протизапальні засоби.

При необхідності курс лікування повторюють через 1 місяць під контролем мікроскопії зіскобів.

При саркотозі і нотоедрозі препарат наносять тонким шаром на попередньо очищенні від струпів уражені ділянки тіла із захопленням прикордонної здорової шкіри до 1 см² з розрахунку 0,8 мл/10 кг маси тіла тварини.

Обробку проводять 2-4 рази з інтервалом 7-10 діб. Тварин з великими ділянками ураження обробляють в два прийоми з інтервалом 1 день, наносячи препарат на уражені місця спочатку однієї, а потім іншої половини тіла.

Для запобігання злизування препарату тварині надягають намордник, шийний комір або замикають щелепи петлею з тісъми, які знімають через 20 хвилин після нанесення препарату.

Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням патогенетичних і симптоматичних лікарських засобів до клінічного одужання тварини, які підтверджують двома негативними результатами мікроскопічних досліджень зіскобів.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам віком до 7 тижнів і/або масою тіла до 1,5 кг.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кропів через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть привести до загибелі тварин.

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до складових препарату.

Не застосовувати одночасно з іншими інсекто-акарицидними препаратами. При ознаках подразнення шкіри слід припинити обробляти тварину та звернутися до лікаря ветеринарної медицини.

Застереження

При підвищений індивідуальній чутливості власника тварини до діючих речовин, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри слід користуватися гумовими рукавицями.

Після маніпуляцій слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Протягом 24 годин після обробки лікарським препаратом тварин не рекомендується гладити. Протягом 48 годин після обробки тварин не слід купати і підпускати до маленьких дітей.

Форма випуску

Випускають розфасованим по 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 мл в полімерні піпетки-крапельниці, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати в закритій упаковці виробника, в сухому, захищенному від прямих сонячних променів місці, окрім від харчових продуктів і кормів, на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів, при температурі від 5 °C до 25 °C.

Термін придатності

Термін придатності в закритому упакуванні - 3 роки.

Тільки для ветеринарного застосування!

Виробник готового продукту

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61157, м. Харків, вул. Селянська, буд. 124, Україна.