

**Нашийник протипаразитарний для собак та котів
Фіпро-Люкс**
листівка-вкладка

Опис

Полімерна стрічка з пряжкою, зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 г нашійника містить діючі речовини:

фіпроніл – 50 мг;

пірипроксифен – 20 мг.

Допоміжні речовини: N-метилпіролідон, ПЕГ-400.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53A, ектопаразитарні препарати для місцевого застосування (ATC vet QP53AX65, фіпроніл, комбінації).

Нашійник протипаразитарний для собак та котів Фіпро-Люкс має виражену інсектоакарицидну дію щодо імагінальних та преімагінальних форм розвитку безкрилих комах: бліх, волосоїдів, вошей; кровосисних двокрилих комах: комарів, гедзів, мошок, мокреців, москітів, зоофільних мух; іксодових та саркоптоїдних кліщів, які тимчасово чи постійно паразитують на зовнішніх покриттях тіла тварин.

Фіпроніл уражає центральну нервову систему ектопаразитів, не впливаючи на центральну нервову систему тварин. Механізм дії фіпронілу на членистоногих полягає в гальмуванні проходження іонів хлору в ГАМК-залежних хлоридних каналах, що порушує роботу нервової системи. Через системне блокування фіпронілом нервової системи настає нервово-перезбудження і загибель ектопаразитів. Фіпроніл виявляє контактну дію і практично не всмоктується крізь шкіру. Він акумулюється в епідермісі, жирових залозах, волосяних фолікулах і, поступово вивільняючись, забезпечує тривалу контактну інсектоакарицидну дію. Створюється ефект «резервуару», що забезпечує тривалу залишкову активність фіпронілу.

Пірипроксифен – інсектицид кишкової і контактної дії з групи аналогів ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток членистоногих. Діюча речовина пригнічує ембріогенез і впливає на нормальний цикл метаморфозу комах (яйце – личинка – лялечка – імаго). Механізм його дії полягає в порушенні процесів синтезу хітину і линьки личинок, перешкоджає розвитку повноцінних лялечок і викликає загибель комах на преімагінальній і імагінальній стадіях розвитку, що призводить до припинення популяції ектопаразитів. Пірипроксифен має тривалу інсектоакарицидну і репелентну дію, він переноситься на шкірно-волосяний покрив тварини, накопичуючись в епідермісі, волосяних цибулинах і жирових залозах шкіри.

Нашійник в рекомендованих дозах не має резорбтивно-токсичної, шкірно-подразнюючої і сенсibiliзуючої дії.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis/felis*, *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*), іксодовими кліщами (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*), саркоптоїдними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) на імагінальній та личинковій стадіях розвитку, а також для захисту тварин від нападу кровосисних двокрилих комах: комарів (*Culicidae*), гедзів (*Tabanidae*), мошок (*Simuliidae*), мокреців (*Ceratopogonidae*), москітів (*Psychodidae*), зоотропних мух (*Muscidae*, *Sarcophagidae*, *Calliphoridae*), особливо в теплу пору року в період їх підвищеної активності.

Дозування

Нашийник виймають з упакування та одягають на шию тварини, фіксують таким чином, щоб між шиєю та нашийником залишався проміжок 1-2 см, потім закріплюють пряжкою та обрізають надлишок.

Нашийник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашийник у закріпленому стані повинен вільно рухатися навколо шиї.

Постійне використання нашийника забезпечує захист тварини від ектопаразитів впродовж 6 місяців.

Один нашийник розрахований для однієї тварини. Залежно від розміру тварин використовуються нашийники різної довжини:

- для котів та собак дрібних порід – нашийник довжиною 35 см;

- для собак середніх та великих порід – нашийник довжиною 70 см.

Протипоказання

Не застосовувати препарат цуценятам та кошенятам віком до 10 тижнів.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати препарат для лікування інших видів тварин, особливо кролів через ризик виникнення небажаних реакцій, які можуть призвести до загибелі тварин.

Підвищена індивідуальна чутливість до складових препарату.

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Не застосовувати одночасно з іншими інсектоакарацидними лікарськими препаратами.

Застереження

При підвищеній індивідуальній чутливості тварини до діючих речовин нашийника та при появі ознак подразнення шкіри, використання нашийника припинити.

При підвищеній індивідуальній чутливості власника тварини до діючих речовин нашийника, при наявності на руках подряпин та ушкоджень шкіри при одяганні нашийника на тварину користуватися гумовими рукавицями.

Після маніпуляцій з нашийником ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Уникати контакту маленьких дітей з тваринами, які мають нашийники.

Форма випуску

Нашийник герметично запакований у полімерну плівку і вкладений у картонну коробку.

Для котів та собак дрібних порід – нашийник довжиною 35 см, для собак середніх та великих порід – нашийник довжиною 70 см.

Зберігання

Зберігати в закритій упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямих сонячних променів, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів і кормів, на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності

Термін придатності в закритому упакуванні - 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Виробник готового продукту

ТОВ «НОВА ПЛЮС», вул. Селянська, буд. 124, м. Харків, 61157, Україна.