

Спрей хлоргексидину біглюконат для тварин 0,05%, 200 мл, MODES

ІНСТРУКЦІЯ

Склад

Діюча речовина: хлоргексидину біглюконат;

100 мл препарату містять розчину хлоргексидину біглюконату 20 % — 0,25 мл;

Допоміжна речовина: вода очищена.

Опис

Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина без запаху.

Фармакологічні властивості

ATC-vet QD08 — антисептики і дезінфектанти QD08AC — хлоргексидин.

Хлоргексидину біглюконат — антисептик, що належить до похідних бігуаніду. Механізм його бактерицидної дії пов'язаний з порушенням рибосомальної РНК і здатністю змінювати властивості клітинної мембрани мікроорганізмів. Хлоргексидину біглюконат ефективний по відношенню до метицилінчутливих стафілококів (MSSA), а також метицилінстійких (MRSA) *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus valivarius*. Препарат володіє високою активністю щодо грампозитивних коків: *Streptococcus viridans* (*Aerococcus viridans*), *Streptococcus haemolyticus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus mutans*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus serotypes i ribotypes*, *Enterococcus species*. Серед грамнегативних бактерій найбільш чутливими до хлоргексидину біглюконату є: *Escherichia coli*, *Haemophilus influenzae*, *Gardnerella vaginalis* і *Acinetobacter*.

Показання до використання

Зовнішньо собакам, котам, хутровим тваринам, великій рогатій худобі, коням, свиням, вівцям, козам, птиці для лікування інфекційних захворювань, ускладнень після хірургічного втручання, уражень шкіри: гнійні рани, тріщини, інфіковані опіки, бактеріальні та грибові

захворювання шкіри, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до хлоргексидину біглюконату.

Використовувати для антисептичної обробки та дезінфекції шкіри, попередження грибкових та стафілококових інфекцій тощо; гігієни в поїздках, походах, при відсутності можливості прийому водних процедур для запобігання розмноженню мікроорганізмів; обробки предметів грумінгу (зубних щіток, гребінців, доглядового приладдя тощо); предметів обігу в цілях профілактики захворювань вірусними інфекціями; обробка саден, подряпин, розчухів укусів комах; застосування в стоматології (гінгівіти, стоматити і пародонтити); захисту від мікробів в громадських місцях, на природі.

Спосіб застосування та дози

Зовнішньо: 5–10 мл розчину наносять на уражену поверхню шкіри або слизові оболонки на 1–3 хв. 2–3 рази на добу (на тампоні або шляхом зрошування).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Схильність до алергічних реакцій та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри.

Несумісний з препаратами йоду через небезпеку виникнення дерматитів, з милом та іншими миючими засобами.

Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними розчинами.

Застереження

У випадку потрапляння препарату на слизову оболонку ока необхідно швидко та ретельно промити її водою.

Умови зберігання

Зберігати в темному, прохолодному, недоступному для дітей місці, захищеному від прямих сонячних променів при температурі від +5°C до +25°C.

Термін придатності

Термін придатності — 3 роки з дати виготовлення.

Термін придатності після першого відкриття — 7 діб.