

КВАНТЕФЕН антигельмінтні таблетки для собак та котів
(таблетки)
листівка–вкладка

Опис

Таблетки округлої або овальної форми з насічкою від світло-сірого до світло-жовтого кольору зі специфічним запахом.

Склад

В 100 мг препарату міститься (мг):

фенбендазол – 71,43;

празіквантел – 7,14.

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремній колоїдний, магнію стеарат, лактоза, ароматизатор штучний.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні препарати (QP 52AC13 фенбендазол, комбінації)

КВАНТЕФЕН – антигельмінтний препарат у вигляді таблеток для собак і котів для лікувально-профілактичних дегельмінтизацій за нематодозів травного каналу та дихальних шляхів, цестодозів, трематодозів та змішаних інвазіях.

Комбінація фенбендазолу та празіквантелу, що входять до складу препарату, забезпечує широкий спектр його антигельмінтної дії на всі фази розвитку гельмінтів, що паразитують у собак та цуценят, котів та кошенят.

Фенбендазол із групи бензімідазолів гальмує у гельмінтів полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів. Препарат викликає порушення метаболізму у гельмінтів, у наслідок чого знижуються засвоєння глюкози, мітохондріальні реакції, порушується мітоз клітин. У результаті цих процесів настає повне виснаження паразитів, що призводить до їх загибелі.

Після перорального введення фенбендазол всмоктується частково, метаболізується в печінці до сульфоксиду (оксфендазол) і далі – до сульфону (оксфендазол сульфону). Фенбендазол та його метаболіти розповсюджуються по органах і тканинах, досягаючи найвищої концентрації у печінці тварини. Виведення з організму відбувається переважно з фекаліями, незначною мірою – з сечею. Період напіввиведення з плазми крові становить від 12 до 18 годин у собак. Екскреція незміненого та метаболізованого фенбендазолу (> 90 %) з фекаліями, незначно з сечею та молоком.

Празіквантел є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод, підвищує проникність мембран клітин гельмінта для іонів кальцію, викликає генералізоване скорочення мускулатури паразита, що переходить в стійкий параліч, що призводить до загибелі гельмінтів. При пероральному введенні лікарського препарату празіквантел добре всмоктується в кишечнику, досягаючи максимальної концентрації крові через 1 – 4 години, зв'язується білками плазми (до 80%), піддається біотрансформації в печінці з утворенням неактивних моно- і полігідроксілованих метаболітів. Виводиться з організму переважно з сечею, і в незначних кількостях – з фекаліями.

Застосування

Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак та цуценят, котів та кошенят:

- за нематодозів травного каналу та дихальних шляхів: *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Trichuris felis*, *Strongyloides stercoralis*, *Eucoleus aerophilus* (син. *Capillaria aerophila*);
- за цестодозів імагінальних та преімагінальних: *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides spp.*, *Diphyllobothrium latum*;
- за трематодозів: *Alaria spp.*, *Opisthorchis felineus*.
- Профілактика та лікування гіардіозу/лямбліозу: *Giardia spp./syn. Lamblia spp.*.

Дозування

Препарат призначений для перорального застосування (*per os*).

Попередньої голодної дієти та застосування проносних засобів не потрібно.

Препарат застосовують тваринам індивідуально, одноразово, в ранкове годування примусово, або з невеликою кількістю їжі у дозі:

Вага таблетки, г	Кількість таблеток, шт	Маса тіла тварини, кг	Фенбендазол, мг	Празіквантел, мг
0,35	1	На 5	250,0	25,0
0,7	1	На 10	500,0	50,0
1,4	1	На 20	1000,0	100,0
2,8	1	На 40	2000,0	200,0

3 лікувальною метою дегельмінтизацію тварин проводять за показаннями одноразово. В залежності від виду паразита та інтенсивності інвазії курс лікування призначається лікарем ветеринарної медицини і може тривати протягом 3 – 10 діб.

3 профілактичною метою дегельмінтизацію проводять у терапевтичній дозі раз в три місяці, а також за 10 – 14 діб перед кожною вакцинацією.

При лікуванні гіардіозу препарат застосовується у дозі згідно таблиці один раз на добу. Тривалість лікування для котів і собак 3 – 10 діб в залежності від інтенсивності інвазії видом *Giardia spp.*.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату!

Не застосовувати виснаженим та ослабленим тваринам.

Не застосовувати самкам під час вагітності та лактації.

Не застосовувати цуценят та кошенят молодше 3-тижневого віку.

Не застосовувати хворим на інфекційні захворювання тваринам!

Не застосовувати одночасно з піперазином та засобами, що інгібують холінестеразу.

Побічна дія

При застосуванні препарату відповідно до цієї інструкції побічних явищ та ускладнень у тварин, як правило, не спостерігається.

При передозуванні у тварин може спостерігатися пригнічений стан, відмова від корму, надлишкове слиновиділення, розлад травного каналу. У цих випадках вживають загальних заходів.

Особливостей дії лікарського препарату при його першому застосуванні та скасуванні не виявлено.

При підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату та появі алергічних реакцій його використання припиняють та призначають тварині антигістамінні препарати та симптоматичну терапію.

Застереження

Можливість застосування препарату під час вагітності та лактації визначає лікар ветеринарної медицини із врахуванням можливих ризиків. При необхідності вагітним самкам препарат призначають за 3 тижні до передбачуваних родів, самкам які годують – через 2 – 3 тижні після родів під наглядом ветеринарного лікаря.

При проведенні дегельмінтизації слід дотримуватися термінів, що рекомендуються листівкою-вкладкою. У разі пропуску чергової обробки застосування препарату відновлюють у тій же дозі за тією самою схемою.

Препарат не призначений для застосування продуктивним тваринам.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом слід дотримуватись загальних правил особистої гігієни та техніки безпеки, передбачених при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Для тварин різної маси тіла випускають таблетки різної ваги по:

0,35 г – для тварин на 5 кг ваги;

0,7 г – для тварин на 10 кг ваги;

1,4 г – для тварин на 20 кг ваги;

2,8 г – для тварин на 40 кг ваги;

Таблетки запаковані у блістери, буфлени, полімерні або фольговані пакети по 1, 3, 4, 6, 10 шт., упаковані в картонну коробку.

Зберігання

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника у сухому, захищеному від прямого сонячного проміння та недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів, при температурі від 5 до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення:

ТОВ «ЗООСІТІ», 62302, м. Дергачі, Харківська обл., вул. Сумський шлях, буд. 163-Г, Україна

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту:

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61030, м. Харків, вул. Колісниченківська, буд. 7, Україна.