

**ПРАЗЕЛ суспензія**  
**(суспензія для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Суспензія світло-жовтого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючі речовини:

пірантелу памоат – 15 мг;

празіквантел – 5 мг.

Допоміжні речовини: 1,2-пропіленгліколь – до 1 мл.

**Фармакологічні властивості**

**ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати, що містять (QP52AA51) празіквантел та пірантелу памоат.**

**Фармакодинаміка**

ПРАЗЕЛ суспензія – антигельмінтний препарат, ефективний проти стьожкових та круглих гельмінтів. Містить діючі речовини: празіквантел та пірантелу памоат.

*Празіквантел* є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод у собак та котів: *Taenia spp.* (*Taenia hydatigena*, *T. pisiformis*, *T. multiceps*, *T. ovis*, *T. serialis*, *T. taeniaeformis* та ін.), *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє на імагінальні та преімагінальні стадії розвитку цестод у кишечнику тварин.

*Пірантелу памоат*, що входить до складу препарату, має дію проти нематод: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma spp.*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.

**Фармакокінетика**

*Празіквантел* швидко всмоктується тегументом цестод, у результаті чого оболонка руйнується, настає розлад метаболізму і загибель гельмінтів. Така швидка дія зумовлена зміною проникливості клітинної мембрани до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку загибель паразиту. Під дією празіквантелу стьожкові гельмінти майже повністю перетравлюються і не виявляються у фекаліях. Максимальна концентрація празіквантелу у плазмі крові досягається через 1 годину. З організму сполука виводиться в основному у вигляді неактивних метаболітів із сечею, період напіввиведення складає біля 3 годин після перорального введення препарату.

*Пірантелу памоат* активний проти нематод, впливає на їх холінергічні рецептори, що призводить до незворотного спастичного паралічу паразитів. Пірантелу памоат майже не всмоктується із кишечника і завдяки цьому пролонгується його антигельмінтна дія. Нематоди виводяться з організму тварин переважно в незміненому вигляді з фекаліями.

Препарат у рекомендованих дозах не виявляє сенсibilізуючої, гепатотоксичної, ембріотоксичної і тератогенної дії.

## **Застосування**

Лікувально-профілактична дегельмінтизація:

- собак при цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia multiceps*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Mesocestoides spp.*), нематодозах (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*) і змішаних цестодо-нематодозних інвазіях;

- котів при цестодозах (*Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Hydatigera taeniaeformis*, *Mesocestoides spp.*), нематодозах (*Toxocara cati*, *Toxocara mystax*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*) і змішаних цестодо-нематодозних інвазіях.

## **Дозування**

Перед застосуванням збовтати!

Препарат застосовують тваринам індивідуально, одноразово, в ранкове годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика за допомогою шприца-туби в наступних дозах:

— цуценят, собакам та кошенят, котам - 1 мл суспензії на 1 кг маси тіла тварини.

Попередньої голодної дієти та застосування послаблюючих засобів не вимагається.

При високій інтенсивності інвазії гельмінтами дегельмінтизацію рекомендується повторити через 10 днів.

Профілактичну дегельмінтизацію тварин проводять один раз в квартал (1 раз в 3 місяці) у вищевказаних дозах.

## **Протипоказання**

Не застосовувати при відомій гіперчутливості до діючих речовин препарату.

Не застосовувати цуценят і кошенят до 3 тижневого віку!

Не застосовувати виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам!

Не застосовувати самкам у першій половині вагітності!

## **Застереження**

Немає.

## **Форма випуску**

Шприц-туба 5, 10 мл в картонній коробці.

## **Зберігання**

Зберігати препарат у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 5 °С до 25 °С.

**Термін придатності** - 3 роки.

***Для застосування у ветеринарній медицині!***

## **Виробник готового продукту**

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61157, м. Харків, вул. Селянська, буд. 124, Україна.