

**ПРАЗЕЛ**  
**(таблетки)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Таблетка від світло-жовтого до жовтого кольору зі специфічним запахом.

**Склад**

Одна таблетка містить діючі речовини:

пірантелу памоат - 150 мг;

празіквантел - 50 мг.

Допоміжні речовини: молочний цукор, крохмаль картопляний, стеарат кальцію, тальк.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати.**

Празел - антигельмінтний препарат, поєднує властивості діючих речовин, які входять до його складу, празіквантелу та пірантелу памоату. Володіє широким спектром антигельмінтної дії проти статевозрілих та личинкових форм круглих (нематод) та стъожкових (цеостод) гельмінтів у собак та котів.

*Пірантелу памоат* діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризації нервово-м'язової блокади.

*Празіквантел* швидко всмоктується зовнішньою оболонкою цестод, після чого настає її пошкодження та скорочення. Наслідком порушення проникаючої властивості мембрани є параліч паразитів.

**Застосування**

Лікувально-профілактична дегельмінтизація собак і котів при нематодозах та цестодозах: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma spp.*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Mesocestoides spp..*

**Дозування**

Препарат дають тваринам індивідуально одноразово з невеликою кількістю корму (ковбаса, м'ясо, фарш, каша) у подрібненому вигляді або примусово на корінь язика.

Продовження додатку 2  
до реєстраційного посвідчення АВ-00634-01-09

Рекомендовані дози:

<i>Вид тварин</i>	<i>Маса тіла тварин, кг</i>	<i>Дозування, таблетки</i>
собаки, у т.ч. цуценята	до 2	$\frac{1}{4}$
собаки	2 - 5	$\frac{1}{2}$
собаки	5 - 10	1
собаки	10 - 20	2
собаки	20 - 30	3
собаки	30 - 40	4
собаки	40 - 50	5
коти	до 2	$\frac{1}{4}$
коти	2 - 5	$\frac{1}{2}$

Профілактичну дегельмінтизацію проводять один раз у квартал.

**Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату!

Не застосовувати цуценятам і кошенятам до 3-х тижневого віку!

Не застосовувати виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам!

Не застосовувати одночасно з піперазином і препаратами, які інгібують холінестеразу!

Не застосовувати самкам в першій половині вагітності!

**Застереження**

Дегельмінтизацію самок за 3 тижні до пологів і 2-3 тижні після пологів проводять лише за оцінкою ризику під контролем лікаря ветеринарної медицини.

**Форма випуску**

Блістери по 10 таблеток, запаковані у картонні упаковки.

**Зберігання**

Зберігати препарат у захищеному від світла місці, окрім від кормів та продуктів харчування, при температурі від 5 °C до 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Термін придатності**

3 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Виробник готового продукту**

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61157, м. Харків, вул. Селянська, буд. 124, Україна.