

Краплі очні та назальні для тварин АНАВІРИН

Опис: прозора рідина.

Склад: 1 мл препарату містить (мг):

глюкамінопропілкарбакридон 20.

Допоміжні речовини : гліцерол, вода очищена.

Фармакологічні властивості: глюкамінопропілкарбакридон відноситься до групи низькомолекулярних індукторів цитокінів і має протизапальну та регенеративну дії. Завдяки глюкамінопропілкарбакридону, який є компонентом засобу, відбувається стимуляція вироблення ендогенного інтерферону, підвищення функціональної активності Т-лімфоцитів і макрофагів, активізація утворення протизапальних цитокінів. Засіб не має місцево-подразнюючої, резорбтивно-токсичної і сенсibiliзуючої дії.

Показання: краплі ефективні у комплексній терапії при ринітах та кон'юнктивітах різної етіології у тварин, покращують самопочуття тварин, швидко зменшують клінічні прояви запалень. Засіб має протівірусну, антимікробну, протизапальну, регенеруючу, імуномодельючу дію, сприяє загоєнню пошкоджених тканин і зменшенню запальних процесів.

Дозування: закапувати в обидва ока при кон'юнктивітах по 2 - 3 краплі 2 рази на добу, при ринітах закапувати по 2 - 4 краплі в кожен носовий хід 2 - 3 рази на добу. Застосовувати засіб протягом 7 - 14 днів до повного одужання тварини.

Протипоказання: можливість застосування крапель самкам у період вагітності та лактації визначає ветеринарний лікар на підставі оцінки співвідношення користі до можливого ризику застосування засобу.

Підвищена індивідуальна чутливість тварини до компонентів засобу.

Застереження: при застосуванні крапель слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, передбачених при роботі з ветеринарними препаратами. Після закінчення обробки тварини руки слід вимити теплою водою з милом.

Зберігання: у сухому темному, недоступному для дітей та тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів при температурі від 5 до 25 ° С.

Термін придатності: 2 роки в закритій упаковці.

ТУ У 21.2-43124105-014:2024