

Мільбентел
антигельмінтні таблетки для собак та цуценят
(таблетки)

листівка–вкладка

Опис

Таблетки округлої форми від світло-жовтого до коричнево-жовтого кольору.

Склад

100 мг препарату містить діючі речовини (мг):

празіквантел – 12,5;

мільбеміцину оксим – 1,25.

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, лактози моногідрат, повідон, натрію кроскармелоза, кремній колоїдний безводний, магнію стеарат, ароматизатор штучний, дріжджі сухі.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA01, празіквантел); ATCvet QP54, ендектоциди (QP54AB01, мільбеміцину оксим)

Мільбентел антигельмінтні таблетки для собак та цуценят відносяться до групи ендектоцидів, що містять дві активні діючі речовини. Таблетки належать до групи комбінованих антигельмінтних препаратів нематодоцидної та цестодоцидної дії. Активні компоненти, що входять до складу препарату, забезпечують його широкий спектр антигельмінтної дії.

Мільбеміцину оксим – макроциклічний лактон, що отримується в результаті ферментативної діяльності *Streptomyces hygroscopicus* var. *Aureolacrimosus*, активний відносно личинок і імаго нематод, паразитуючих в травному каналі собак та цуценят, а також личинок *Dirofilaria spp.*

Механізм дії мільбеміцину оксиму обумовлений підвищенням проникності клітинних мембран для іонів хлору (Cl⁻), що призводить до надмірної поляризації мембран клітин нервової і м'язової тканини, паралічу і загибелі паразита. Максимальна концентрація мільбеміцину оксиму в плазмі крові тварини досягається протягом 2 – 4 годин, біодоступність становить близько 80%. З організму виводиться в основному в незмінному вигляді.

Празіквантел є ацильованим похідним піразинізохіноліна, володіє вираженою дією проти цестод і нематод. Підвищуючи проникність клітинних мембран паразита для іонів кальцію (Ca²⁺), викликає деполяризацію мембран, скорочення мускулатури і руйнування тегумента, що призводить до загибелі паразита і сприяє його виведенню з організму тварини. Максимальна концентрація празіквантелу в плазмі крові тварин досягається через 1-4 години. Він піддається швидкій і практично повній біотрансформації в печінці. Рівень зв'язування в плазмі становить близько 80%, виводиться з організму протягом 2 діб в основному з сечею.

Мільбентел антигельмінтні таблетки для собак та цуценят за ступенем впливу на організм відносяться до речовин малонебезпечних, в рекомендованих дозах не надають сенсibilізуючу, ембріотоксичну і тератогенну дії, добре переносяться собаками різних порід і віку.

Препарат токсичний для бджіл, а також риб і інших гідробіонтів.

Застосування

Таблетки призначають собакам та цуценят для лікувальної та профілактичної дегельмінтизації проти імагінальних та преімагінальних цестод травного каналу – *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocostoides spp.*, та проти нематод – *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Thelazia callipaeda*, *Angiostrongylus vasorum* (знижує інтенсивність зараження), *Crenosoma vulpis* (знижує інтенсивність зараження), *Dirofilaria spp.* (профілактика захворювання).

Дозування

Препарат призначений для перорального застосування (per os).

Препарат застосовують собакам одноразово під час годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика після годування, з розрахунку:

Вага таблетки, мг	Маса тіла тварини, кг	Мільбемицину оксим, мг	Празіквантел, мг	Кількість таблеток
200	0,5 – 1,0	1,25	12,5	½ табл.
	1,0 – 5,0	2,5	25,0	1 табл.
1000	5,0 – 10,0	6,25	62,5	½ табл.
	10,0 – 25,0	12,5	125,0	1 табл.
	25,0 – 50,0	25,0	250,0	2 табл.
3000	50,0 – 75,0	37,5	375,0	1 табл.

Попередньої голодної дієти і застосування проносних засобів перед дегельмінтизацією не вимагається.

Профілактика тварин: таблетки призначають один раз у квартал (3 місяці) у вищевказаних дозах, а також за 2 тижні до вакцинації.

Для дегельмінтизації собак при інвазії, спричиненій *Angiostrongylus vasorum* таблетки для собак застосовують з лікувальною метою чотириразово з інтервалом 7 діб, з метою профілактики – кожні 4 тижні у терапевтичній дозі.

Для дегельмінтизації собак при інвазії, викликаній *Thelazia callipaeda*, препарат застосовують дворазово з інтервалом 7 діб.

З метою профілактики дирофіляріозу в несприятливих щодо захворювання регіонах препарат застосовують у весняно-літньо-осінній період: перед початком льоту комарів і москітів (переносників збудника *Dirofilaria spp.*) одноразово, потім 1 раз на місяць і останній раз в сезоні не раніше, ніж за 1 місяць після завершення льоту комах. Перед дегельмінтизацією, слід проконсультуватися з ветеринарним лікарем, щоб виключити наявність у тварини у крові мікрофілярій.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із відомою підвищеною індивідуальною чутливістю до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі)!

Не застосовувати тваринам з вираженим порушенням функції нирок та печінки.

Не застосовувати виснаженим тваринам та хворим на інфекційні хвороби!

Не застосовувати цуценятм молодше 2-тижневого віку і масою тіла менше 0,5 кг.

Застереження

Таблетки для собак сумісні з селамектином, відомості про сумісність препарату з іншими макроциклічними лактонами відсутні.

При передозуванні препаратом у деяких тварин можуть спостерігатися пригнічений стан, слинотеча, парез м'язів, тремтіння і (або) хитка хода. Ці симптоми проходять мимовільно протягом доби, при необхідності тварині призначають засоби симптоматичної терапії.

Дегельмінтизацію цуценятм породи коллі, бобтейл та шелті при необхідності проводять під наглядом ветеринарного лікаря.

Можливість застосування препарату під час вагітності та лактації визначає лікар ветеринарної медицини із врахуванням можливих ризиків.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Для запобігання доступу дітей до ветеринарного препарату рекомендується діставати його по одній таблетці з блістера та одразу ховати блістер в упаковку.

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

При випадковому заковтування препарату людиною можливі розлади нервової системи, і тому у таких випадках необхідно одразу звернутися до лікаря (при собі мати листівку-вкладку або етикетку препарату).

Форма випуску

Таблетки запаковані по 1; 2; 10; 15 та 30 штук у блістери з аклар ламінованої ПВХ плівки закриті алюмінієвою фольгою на паперовій основі. Блістери упаковані в картонну коробку.

Зберігання

Зберігати препарат в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей і тварин місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності: 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

ТОВ «ТЕРРАВЕТ-ТРЕЙДІНГ», 62302, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, буд. 163Г, кім. 1, Україна

Назва та місцезнаходження виробника готового продукту

ТОВ «НОВА ПЛЮС», 61030, м. Харків, вул. Колісниченківська, буд.7, Україна

ТОВ «ХАРКІВСЬКА БІОФАБРИКА», 61057, м. Харків, пров. Людмили Гурченко, буд. 10, Україна.