

Хлоргексидин 1% спрей

Форма випуску: Розчин у флаконі з розпилювачем

Склад: Вода очищена, Хлоргексидину диглюконат — 1%

- INCI: Aqua, Chlorhexidine Digluconate

Фармакологічні властивості

Хлоргексидину диглюконат — антисептик з помірною концентрацією, що забезпечує м'яку, але ефективну антимікробну дію.

- Механізм дії: зв'язується з фосфоліпідами клітинної мембрани, порушуючи її цілісність
- Активний проти грампозитивних бактерій, менш ефективний проти грамнегативних та грибків
- Підходить для щоденного догляду, профілактики інфекцій, обробки чутливої шкіри
- Не абсорбується системно, не токсичний
- Тривалість дії — до 4 годин

Показання

- Лікування бактеріальних та грибкових дерматитів
 - Обробка неускладнених ран, саден, подряпин
 - Щоденний догляд за шкірою тварин з підвищеною чутливістю
- Догляд за шкірою при алергічних та себорейних станах

Спосіб застосування

- Наносити спрей на уражену ділянку до помірного зволоження шкіри (3-5 розпилень, в залежності від розміру ураження)
 - Частота: 1–2 рази на добу
 - Не змивати, дати висохнути
 - Можна застосовувати тривало

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Схильність до алергічних реакцій та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри.
- Несумісний з препаратами йоду через небезпеку виникнення дерматитів, з милом та іншими миючими засобами.
- Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними розчинами.

Зберігання

- Температура: +5...+25°C
- У сухому, темному місці
- Термін придатності: 36 місяців

Хлоргексидин 2% спрей

Форма випуску

Розчин у флаконі з розпилювачем

Склад

- Вода очищена
- Хлоргексидину диглюконат — 2%

INCI: Aqua, Chlorhexidine Digluconate

Фармакологічні властивості

Хлоргексидину диглюконат у концентрації 2% — антисептик із вираженою антимікробною активністю.

- **Механізм дії:** зв'язується з фосфоліпідами клітинної мембрани, порушуючи її цілісність
- **Активність:** ефективний проти грампозитивних бактерій, більш виражена дія проти грамнегативних бактерій у порівнянні з 1% розчином; частково активний проти грибків
- **Застосування:** для лікувальної обробки, профілактики інфекцій, дезінфекції шкіри та поверхневих ран
- **Фармакокінетика:** не абсорбується системно, не токсичний при зовнішньому застосуванні
- **Тривалість дії:** до 6 годин

Показання

- Лікування бактеріальних дерматитів, піодермій
- Обробка інфікованих та неускладнених ран, саден, подряпин
- Профілактика інфекцій після хірургічних втручань, інвазивних процедур
- Догляд за шкірою тварин при схильності до бактеріальних ускладнень
- Допоміжний засіб при грибкових ураженнях (у складі комплексної терапії)

Спосіб застосування

- Наносити спрей на уражену ділянку до помірного зволоження шкіри (2–4 розпилення, залежно від площі ураження)
- Частота: **1–2 рази на добу**
- Не змивати, дати висохнути природним шляхом
- Можна застосовувати курсами або тривало, за потреби

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів препарату

- Схильність до алергічних реакцій, алергічні дерматити
- Вірусні захворювання шкіри
- Несумісність із препаратами йоду (ризик дерматитів), милом та іншими миючими засобами
- Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними розчинами

Зберігання

- Температура: +5...+25°C
- У сухому, темному місці
- Термін придатності: 36 місяців

Хлоргексидин 4% спрей

Форма випуску: Розчин у флаконі з розпилювачем

Склад: Вода очищена, хлоргексидину диглюконат — 4%

- INCI: Aqua, Chlorhexidine Digluconate

Фармакологічні властивості

Хлоргексидину диглюконат — катіонний бігуанід з вираженою антисептичною дією.

- Механізм дії: порушує осмотичний баланс клітинної мембрани мікроорганізмів, викликаючи її руйнування
- Спектр активності: грампозитивні та грамнегативні бактерії (включно з MRSA), дерматофіти, дріжджі (*Candida spp.*), віруси з ліпідною оболонкою
- Стійкий до органічних речовин, зберігає активність у присутності гною та білків
- Не абсорбується через шкіру, не має системної дії
- Тривалість антимікробного ефекту — до 6 годин

Показання

- Лікування бактеріальних та грибкових дерматитів
- Обробка ран, саден
- Догляд за шкірою при алергічних та себорейних станах

Спосіб застосування

- Наносити спрей на уражену ділянку до помірного зволоження шкіри (3-5 розпилень, в залежності від розміру ураження)
- Частота: 2–3 рази на добу
- Не змивати, дати висохнути природним шляхом

Протипоказання

- Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Схильність до алергічних реакцій та алергічних захворювань, дерматити, вірусні захворювання шкіри.
- Несумісний з препаратами йоду через небезпеку виникнення дерматитів, з милом та іншими миючими засобами.
- Не застосовувати одночасно з іншими антисептичними розчинами.

Зберігання

- Температура: +5...+25°C

- У сухому, темному місці
- Термін придатності: 36 місяців