

УНОФЕН
(суспензія для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія від світло-сірого до сірого кольору, зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину, (мг):

фенбендазол — 100,0.

Допоміжні речовини: сахароза, карбомер, кислоти лимонної моногідрат, метилпарабен (Е 218), ароматизатор, 1,2-пропіленгліколь, вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP52, антигельмінтні препарати (QP52AC13 фенбендазол)

УНОФЕН — антигельмінтний препарат у вигляді суспензії для перорального застосування, що застосовується для профілактики та лікування собак і котів та має широкий спектр нематодоцидної, цестодоцидної дії, активний по відношенню до дорослих форм та личинок нематод травного каналу і легень та окремих видів цестод. Механізм дії препарату полягає у руйнуванні мікроканальців в клітинах кишечника гельмінтів і порушенні енергетичних процесів, що призводить до загибелі паразитів.

Фенбендазол гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, що викликає загибель паразитів від виснаження. Проявляє високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії проти зрілих та незрілих стадій паразитів. Після перорального введення фенбендазол всмоктується частково, метаболізується в печінці до сульфоксиду (оксфендазол) і далі до сульфону (оксфендазол сульфон). Фенбендазол та його метаболіти розповсюджуються по органах і тканинах, досягаючи найвищої концентрації у печінці тварини. Виведення з організму відбувається переважно з фекаліями, незначною мірою з сечею. Період напіввиведення з плазми крові становить від 12 до 18 годин у собак. Екскреція незміненого та метаболізованого фенбендазолу (> 90%) з фекаліями, незначно з сечею та молоком.

Застосування

Призначають цуценятам, кошенятам, дорослим собакам та котам з профілактичною та лікувальною метою при нематодозах, цестодозах і змішаних інвазіях, спричинених гельмінтами або найпростішими:

- нематодами травного тракту та дихальних шляхів (*Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxocara mystax*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*);
- цестодами (*Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocestoides spp.*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*);
- лямбліями (*Giardia duodenalis*, *G. intestinalis* або *G. Lamblia*).

Дозування

Перед застосуванням збовтати!

Препарат застосовують для профілактичної дегельмінтизації тваринам індивідуально, одноразово, в ранкове годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика за допомогою шприца-дозатора в наступних дозах:

- дорослим собакам та котам, цуценятам та кошенятам — 1 мл суспензії на 2 кг маси тіла тварини, один раз на добу (що еквівалентно 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла).

З профілактичною метою УНОФЕН суспензію призначають у зазначених дозах 1 раз на 3 місяці та за 10–14 днів перед кожною вакцинацією.

При лікуванні гірдіозу УНОФЕН застосовується у дозі з розрахунку 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла тварини, один раз на добу. Тривалість лікування для котів і собак 3–10 днів, в залежності від інтенсивності інфекції.

З метою лікування дегельмінтизацію тварин проводять за показаннями одноразово, при сильному ступені інвазії обробку рекомендується повторити через 10 днів.

Хворим та виснаженим тваринам доза та лікувальний курс підбираються індивідуально. В залежності від виду і ступеня інвазії курс лікування призначається лікарем ветеринарної медицини і може тривати протягом 3–10 днів.

Побічна дія

При застосуванні препарату відповідно до цієї інструкції побічних явищ та ускладнень у тварин, як правило, не спостерігається.

При передозуванні у тварин може спостерігатися пригнічений стан, відмова від корму, надлишкове слиновиділення, розлад шлунково-кишкового тракту. У цих випадках вживають загальних заходів.

Особливостей дії лікарського препарату при його першому застосуванні та скасуванні не виявлено.

При підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату та появі алергічних реакцій його використання припиняють та призначають тварині антигістамінні препарати та симптоматичну терапію.

Протипоказання

Не застосовувати за наявності відомої гіперчутливості до компонентів препарату.

Не застосовувати тваринам, що не досягли віку 2 тижнів.

Не застосовувати виснаженим та ослабленим тваринам.

Вагітним собакам не слід призначати препарат до 39-го та після 50-го дня періоду вагітності.

Не застосовувати кішкам у період вагітності та лактації, без попередньої консультації з лікарем ветеринарної медицини.

Не застосовувати одночасно з піперазином та засобами, що інгібують холінестеразу.

Застереження

Під час роботи з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Під час роботи з препаратом використовувати гумові рукавички. Після роботи з препаратом вимити руки з милом.

Уникати випадкового попадання препарату у ШКТ людини. При випадковому попаданні препарату у ШКТ людини необхідно негайно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату. При випадковому попаданні препарату на шкіру одразу змити його проточною водою з милом. При випадковому попаданні препарату в очі відразу промити їх чистою водою.

Форма випуску

Полімерні шприци-дозатори по 5, 10, 15 та 30 мл, упаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 5 до 25°C.

Термін придатності — 3 роки. Термін придатності після відкриття флакона — 6 місяців.

Лише для ветеринарної медицини!