УНОФЕН

антигельмінтні таблетки для собак та котів

листівка-вкладка

Опис

Таблетки округлої або овальної форми з насічкою, від світло-сірого до сірого кольору, зі специфічним запахом.

Склад

100 мг препарату містить діючу речовину, (мг):

фенбендазол — 62,5.

Допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, кремній колоїдний, магнію стеарат, лактоза, ароматизатор штучний.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP52, антигельмінтні препарати (QP52AC13 фенбендазол)

УНОФЕН антигельмінтні таблетки для собак та котів — антигельмінтний препарат у вигляді таблеток для перорального застосування, що призначають для профілактики та лікування гельмінтозів у собак та котів. Препарат має широкий спектр нематодоцидної, цестодоцидної дії, активний по відношенню до дорослих форм та личинок нематод травного каналу і легень та окремих видів цестод.

Механізм дії препарату полягає у руйнуванні мікроканальців в клітинах кишечнику гельмінтів і порушенні енергетичних процесів, що призводить до загибелі паразитів.

Фенбендазол гальмує полімеризацію білків тубулінів у мікротубуліни, знижує активність енергетичних ферментів, що викликає загибель паразитів від виснаження. Проявляє високу антигельмінтну активність і широкий спектр дії проти зрілих та незрілих стадій паразитів.

Після перорального введення фенбендазол всмоктується частково, метаболізується в печінці до сульфоксиду (оксфендазол) і далі до сульфону (оксфендазол сульфон). Фенбендазол та його метаболіти розповсюджуються по органах і тканинах, досягаючи найвищої концентрації у печінці тварини. Виведення з організму відбувається переважно з фекаліями, незначною мірою з сечею.

Період напіввиведення з плазми крові становить від 12 до 18 годин у собак. Екскреція незміненого та метаболізованого фенбендазолу (> 90%) з фекаліями, незначно з сечею та молоком.

Застосування

Призначають цуценятам, кошенятам, дорослим собакам та котам з профілактичною та лікувальною метою при нематодозах, цестодозах і змішаних інвазіях, спричинених гельмінтами або найпростішими:

• нематодами травного тракту та дихальних шляхів (*Toxocara canis, T. cati, Toxocara mystax, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis*);

• цестодами (*Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis, Mesocestoides spp., Dipylidium caninum, Diphyllobothrium latum, Taenia spp., Multiceps multiceps*);

• лямбліями (*Giardia duodenalis, G. intestinalis* або *G. Lamblia*).

Дозування

Препарат застосовують тваринам індивідуально, перорально, одноразово, без попередньої підготовки у вигляді голодування або проносних засобів, в ранкове годування з невеликою кількістю корму або вводять примусово на корінь язика у відповідних дозах, зазначених у таблиці:

Вага таблетки, г	Фенбендазол, мг	Маса тіла тварини, кг	Кількість таблеток, шт.
0,4	250,0	На 5,0 кг	1 таблетка
0,8	500,0	На 10,0 кг	1 таблетка

Дорослим котам та собакам з метою лікування та профілактики інвазійних захворювань препарат призначають у розрахунку 50 мг фенбендазолу на добу на 1 кг маси тіла тварини.

З профілактичною метою УНОФЕН антигельмінтні таблетки для собак та котів призначають у зазначених дозах 1 раз на 3 місяці та за 10–14 днів перед кожною вакцинацією.

При лікуванні гіардіозу препарат застосовується у дозі з розрахунку 50 мг фенбендазолу на 1 кг маси тіла тварини, один раз на добу. Тривалість лікування для котів і собак становить 3–10 днів, в залежності від інтенсивності інфекції.

З метою лікування дегельмінтизацію тварин проводять за показаннями одноразово, при сильному ступені інвазії обробку рекомендується повторити через 10–14 днів.

В залежності від виду і ступеня інвазії, курс лікування призначається лікарем ветеринарної медицини і може тривати протягом 3–10 днів.

Побічна дія

При застосуванні препарату відповідно до цієї інструкції побічних явищ та ускладнень у тварин, як правило, не спостерігається.

При передозуванні у тварин може спостерігатися пригнічений стан, відмова від корму, надлишкове слиновиділення, розлад шлунково-кишкового тракту. У цих випадках вживають загальних заходів.

Особливостей дії лікарського препарату при його першому застосуванні та скасуванні не виявлено.

При підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату та появі алергічних реакцій його використання припиняють та призначають тварині антигістамінні препарати та симптоматичну терапію.

Протипоказання

Не застосовувати за наявності відомої гіперчутливості до компонентів препарату.

Не застосовувати тваринам, що не досягли віку 2 тижнів.

Не застосовувати виснаженим та ослабленим тваринам.

Вагітним собакам не слід призначати препарат до 39-го та після 50-го дня періоду вагітності.

Не застосовувати кішкам у період вагітності та лактації без попередньої консультації з лікарем ветеринарної медицини.

Не застосовувати одночасно з піперазином та засобами, що інгібують холінестеразу.

Застереження

При роботі з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Під час роботи з препаратом використовувати гумові рукавички. Після роботи з препаратом вимити руки з милом.

Уникати випадкового попадання препарату у ШКТ людини. При випадковому попаданні препарату у ШКТ людини необхідно негайно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату. При випадковому попаданні препарату на шкіру одразу змити його проточною водою з милом. При випадковому попаданні препарату в очі відразу промити їх чистою водою.

Форма випуску

Таблетки у блістерах, буфленах, полімерних або фольгованих пакетах по 1, 3, 4, 6, 10 шт., упаковані в картонну коробку.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 5 до 25°С.

Термін придатності — 3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!