Сухе молоко для кошенят

Молочна суміш для кошенят створена з урахуванням фізіологічних потреб їхнього організму на ранніх етапах розвитку. Вона містить комплекс поживних речовин, необхідних для правильного росту та формування тварини. Продукт може використовуватися як повноцінна альтернатива материнському молоку для новонароджених, а також як допоміжне харчування у період переходу на інший корм. Крім того, суміш рекомендована вагітним і лактуючим самкам, а також тваринам у період відновлення після захворювань.

У випадках, коли кошенята не мають можливості харчуватися материнським молоком (народилося багато кошенят, нестача молока у кішки, відсутність матері тощо), слід застосовувати спеціальний молочний замінник, максимально наближений за складом до природного котячого молока.

Формула сухого молока створена для легкого засвоєння, має оптимальний баланс жирів, вітамінів, мінералів та мікроелементів і додатково збагачена амінокислотами, зокрема таурином, необхідним для життєдіяльності котів. Регулярне використання сухого молока сприяє стабільному набору маси тіла, правильному розвитку органів і загальному зміцненню організму.

Починаючи з 36-го дня життя, рекомендується поступово вводити більш тверду їжу.

Склад: сироватковий протеїн, молочний концентрат, молочні жири, кокосове молоко, полісахариди (бета-глюкан), альбумін, лецитин, таурин, фруктоолігосахариди, мінеральні речовини, вітаміни.

Сирий протеїн — 33,5%; сирий жир — 38%; сира зола — 6,7%; волога — 3,6%.

В 1 кг добавки міститься:

вітаміни: А — 22500 МО; D3 — 1800 МО; Е — 100 МО; С — 53 мг, В1 — 9,5 мг; В2 — 14 мг; В3 — 51 мг; В6 — 6,5 мг; В12 — 59 мкг; біотин — 220 мкг; фолієва кислота — 4 мг; К3 — 0,17 мг; залізо — 80 мг; мідь — 0,29 мг; марганець — 4,5 мг; йод — 0,2 мг; цинк — 40 мг; селен — 0,22 мг; калій — 0,14 мг; таурин — 1300 мг; фруктоолігосахариди — 0,12 г; амінокислоти — 1,2 г; омега-3 — 0,14 г; омега-6 — 1,5 г.

Дозування

Норми годування

Вік у днях	Кількість годувань на день
2–7	8–12 (кожні 2–3 години, в тому числі вночі)
8–21	8 (кожні 3 години, в тому числі вночі)
22–28	6–8 (кожні 3–4 години, в тому числі вночі)
29–35	4–6 (в тому числі один раз вночі)
36–42	3

Годування осиротілих кошенят	
Вага тварини, г	Максимальна доза молока на день, мл
100	50
200	80
400	135
600	180
1000	250

До досягнення 6-тижневого віку суміш допускається застосовувати як додаткове джерело поживних речовин у кількості до 40 мл на 1 кг маси тіла. Після 6 тижнів, а також для

дорослих тварин у період вагітності, лактації, хвороби чи реабілітації, рекомендована норма становить до 13 мл на 1 кг ваги.

Пропорції приготування:
30 г сухої суміші на 100 мл теплої води.

Мірна ложка:
1 мірна ложка — 5 г.

Перед приготуванням усі ємності та аксесуари повинні бути ретельно простерилізовані, особливо при годуванні новонароджених кошенят. У пляшечку налийте необхідну кількість чистої питної води, підігрітої до температури близько 50°С, після чого додайте відповідну дозу порошку. Закрийте ємність і добре струсіть до повного розчинення. Перед годуванням охолодіть суміш до 38°С та перевірте температуру, нанісши кілька крапель на тильну сторону руки.

Приготовлений продукт допускається зберігати в холодильнику не довше 24 годин. Перед повторним використанням суміш необхідно підігріти.

Через індивідуальні особливості кошенят (вік, порода, розмір) встановити точну добову норму неможливо, тому рекомендовано годування за потребою. Для контролю розвитку кожне кошеня слід регулярно зважувати та відстежувати щоденний приріст маси.

Умови зберігання: зберігати в прохолодному сухому захищеному від світла, недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25ºС в оригінальному щільно закритому упакуванні виробника. Після відкриття упакування рекомендовано використати суміш протягом трьох місяців.

Термін придатності: 12 місяців

ТУ У 10.9-43124105-015:2026

Вміст банки — 300 грамів.