Сухе молоко для цуценят

Молочна суміш для цуценят створена з урахуванням потреб їхнього організму на початкових етапах життя. Вона містить необхідний комплекс поживних речовин, що забезпечують правильний ріст і розвиток тварини. Продукт може використовуватись як повноцінне харчування для новонароджених, а також як допоміжний раціон у період відлучення від материнського молока і переходу на основні корми. Крім того, суміш підходить для вагітних і лактуючих самок, а також для тварин у період хвороби або відновлення.

У ситуаціях, коли цуценята не мають можливості отримувати материнське молоко (багато новонароджених, недостатня лактація у самки, відсутність матері тощо), рекомендується застосовувати спеціалізований молочний замінник, склад якого максимально наближений до природного молока суки.

Формула молочної суміші забезпечує легке перетравлювання, має збалансований вміст жирів, вітамінів, мінеральних речовин та мікроелементів і додатково збагачена амінокислотами, зокрема таурином, необхідним для нормального функціонування організму собак. Регулярне застосування сприяє стабільному набору маси тіла, правильному формуванню органів і гармонійному росту цуценяти.

Починаючи з 36-го дня життя, рекомендується поступово вводити більш щільні види корму.

Склад: сироватковий протеїн, молочний концентрат, молочні жири, соєве молоко, полісахариди (бета-глюкан), альбумін, лецитин, таурин, фруктоолігосахариди, мінеральні речовини, вітаміни.

Сирий протеїн — 33,5%; сирий жир — 38%; сира зола — 6,7%; волога — 3,6%.

В 1 кг добавки міститься:

вітаміни: А — 23000 МО; D3 — 1800 МО; Е — 95 МО; С — 50 мг, В1 — 10,5 мг; В2 — 14 мг; В3 — 52 мг; В6 — 7 мг; В12 — 58 мкг; біотин — 210 мкг; фолієва кислота — 4,2 мг; К3 — 0,18 мг; залізо — 80 мг; мідь — 0,28 мг; марганець — 4,7 мг; йод — 0,2 мг; цинк — 41 мг; селен — 0,21 мг; калій — 0,13 мг; таурин — 1200 мг; фруктоолігосахариди — 0,12 г; амінокислоти — 1,2 г; омега-3 — 0,13 г; омега-6 — 1,5 г.

Дозування

Норми годування

Вік у днях	Кількість годувань на день
2–14	6–8 (кожні 3–4 години, в тому числі вночі)
15–21	6 (кожні 4 години, в тому числі вночі)
22–28	6 (у тому числі один раз вночі)
29–35	4–6
36–42	2–4
43–49	0–3

Годування осиротілих цуценят	
Вага тварини, г	Максимальна доза молока на день, мл
250	100
500	160
1000	250
2000	400
5000	900

До досягнення 6-тижневого віку суху молочну суміш можна використовувати як додаткове

джерело поживних речовин у кількості до 40 мл на 1 кг маси тіла. Після 6 тижнів, а також для дорослих собак у період вагітності, лактації, захворювання або відновлення, рекомендована норма становить до 13 мл на 1 кг ваги.

Пропорції приготування:

30 г сухої суміші на 100 мл теплої води.

Мірна ложка:

1 мірна ложка — 5 г.

Перед приготуванням суміші усі ємності та аксесуари необхідно ретельно простерилізувати, особливо під час годування новонароджених цуценят. У пляшечку налийте потрібну кількість чистої питної води, підігрітої до 50°С, після чого додайте відповідну дозу сухої суміші. Закрийте пляшечку та добре струсіть до отримання однорідної консистенції. Перед годуванням охолодіть суміш до температури близько 38°С і перевірте її, капнувши кілька крапель на тильну сторону руки.

Готову суміш дозволяється зберігати в холодильнику не більше 24 годин. Перед повторним використанням її необхідно підігріти.

Через індивідуальні особливості тварин (вік, порода, розміри) точне визначення добової норми неможливе, тому найбільш доцільним є годування за потребою. Для контролю розвитку кожне цуценя слід регулярно зважувати та відстежувати щоденний приріст маси тіла.

Умови зберігання: в прохолодному сухому захищеному від світла, недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25°С в оригінальному щільно закритому упакуванні виробника. Після відкриття упакування рекомендовано використати суміш протягом трьох місяців.

Термін придатності: 12 місяців

ТУ У 10.9-43124105-015:2026

Вміст банки — 300 грамів.